

	ÁJULÁS	PÁNIK (TÚFRÁSZ)	ANAFILAXIA
TÜNETEK	oltás előtt / alatt/után percekben	oltás előtt / alatt/ után percekben	oltás után percekben belül & órák múlva
Bőr tünet	sápadtság, nyirkos bőr	hyperaemia, izzadás	viszkető bőr, flush vagy pallor urticaria, angiooedema
Légúti tünet	Normál	hyperventilláció paraesthesia (zsibbadás, bizsergés)	köhögés, dyspnoe, stridor, tachypnoe, bordaközi izmok behúzódása
Keringés	bradikardia, erős centrális pulzus, átmeneti hypotensio fektetéssel rendeződik	tachicardia, erős centrális pulzus, hypertensio	tachycardia, gyenge pulzus hypotensio fektetésre nem rendeződik)
Idegrendszer	eszmélet vesztés (fektetésre láb emelésre rendeződik), emlékezet kihagyás, végtagrángás/re megés	szorongás, hangoskodás	erős szorongás, eszmélet vesztés (nem rendeződik fektetésre)
FONTOS	percek alatt RENDEZŐDIK	TÜRELEM rendeződik, végig kontaktusban kell tartani, oltás előtt lehangosabbak, sokat beszélnek	PROGREDIÁL beavatkozás nélkül