























félbe kellett szakítani, mert az elsődleges adatok alapján annyival jobbak voltak a ligáció eredményei. **Ajánlás erőssége: B** (Jutabha R és mtsai, 2005)

A colonoscopia során lehetőség van a polypok eltávolítására, ez elsősorban a juvenilis formánál jön szóba, ami gyermekkorban a leggyakoribb. Szövődmények előfordulásával (perforáció, vérzés) a korszerű eszközök birtokában csak ritkán kell számolni.

#### **IV. Rehabilitáció**

#### **V. Gondozás**

#### **VI. Irodalomjegyzék**

1. Jutabha R, Jensen DM, Martin P, Savides T, Han SH, Gombeln J. Randomized study comparing banding and propranolol to prevent initial variceal hemorrhage in cirrhotics with high-risk esophageal varices. Gastroenterology. 2005;128(4):870-81
2. Zargar SA, Javid G, Khan BA, Shah OJ, Yattoo GN, Shah AH, Gulzar GM, Singh J, Shah NA, Shafi HM. Endoscopic ligation vs. sclerotherapy in adults with extrahepatic portal venous obstruction: a prospective randomized study. Gastrointest Endosc. 2005;61(1):58-66

A szakmai protokoll érvényessége: 2008. december 31.

Egészségügyi Minőségfejlesztési és Kórláti Intézet